

Webseite IBCH-Abflussregimetyp (IBCH-Q-Regime)

Mit der MSK-Methode Makrozoobenthos (IBCH) werden Fließgewässer anhand der wirbellosen Kleinlebewesen am Gewässergrund beurteilt.

Je nach Höhe, geographischer Lage und Fließgewässergrösse variiert die Anzahl beobachteter Taxa natürlicherweise. Aus diesem Grund wird diese Anzahl mit einem Korrekturwert multipliziert. Im IBCH-Laborprotokoll muss jeweils der IBCH-Q-Regimetyp angegeben werden, der Korrekturwert wird dann automatisch verrechnet.

Der IBCH-Q-Regimetyp der Schweizer Gewässer kann auf dieser [Webseite](#) ermittelt werden. Dieser Link ist auch auf dem IBCH-Laborprotokoll zu finden.

Die Daten können auch direkt von [hier](#) heruntergeladen werden (zip, 260MB).

Page Web Type de régime d'écoulement IBCH (régime IBCH-Q)

La méthode du SMG Macrozoobenthos (IBCH) permet d'évaluer les cours d'eau sur la base des invertébrés benthiques.

Le nombre de taxons observés varie naturellement en fonction de l'altitude, de la région géographique et de la taille du cours d'eau. C'est pourquoi ce nombre est multiplié par une valeur de correction. Le type de régime IBCH-Q doit être indiqué dans le protocole de laboratoire IBCH, la valeur de correction est alors calculée automatiquement. La présente page permet de déterminer le type de régime IBCH-Q des cours d'eau suisses.

Le type de régime IBCH-Q des cours d'eau suisses peut être déterminé sur [ce site web](#). Ce lien se trouve également sur le protocole de laboratoire IBCH.

Les données peuvent également être téléchargées directement depuis [ici](#) (zip, 260MB).